Породи овце

Стара Загора

2011

Зоологическа класификация

Групи	Форма и дължина на опашката	Породи
1. Късотънко-опашати	Опашката е къса, не достига скакателните стави. По дължината й липсват тлъстинни отслоявания.	Северни късоопашати овце, Романовска, Фински ландрас
2. Дълготънко-опашати	Опашката е с по-голяма дължина и достига под скакателните стави. По нея липсват тлъстинни отслоявания	Тънкорунни породи, Английски породи за месо, Цигай и др.
3. Късотлъсто-опашати	Опашката е къса и не достига скакателните стави. Отслояването на тлъстини е локализирано в корена на опашката.	Породи овце с груба вълна Хиос
4.Дълготлъсто-опашати	Опашките са дълги, под скакателните стави, с големи тлъстинни отслоявания по цялата дължина.	Местни азиатски породи Каракулска, Грузинска тънкорунна и др.
5. Кюрдючни тлъстозаднести	Опашката е къса и недоразвита – състои се от 5-8 прешлена. Тлъстинните отслоявания образуват кюрдюк - мастно образование под формата на възглавница.	Азиатски породи Хисарска, Еделбаевска, Аваси

Късотънкоопашати

Дълготънкоопашата

Кюрдючна

Производствена (стопанска) класификация

1. Тънкорунни породи

а) за вълна (Австралийски меринос, Грозненска, Ставрополска)

б) за вълна и месо (Асканийска, Кавказка, СИБТ, ТТ, ДТ, КТ)

в) за месо и вълна (Прекос, Меринофлайш, Южноафрикански меринос и др.)

2. Полутънкорунни породи

а) за вълна и месо:

- Английски дълговълнести (Линколн, Ромни нарш, Бордер лейстър)
- Коридел (Новозеландски коридел, Северокавказка, ЮБК, СБК)

б) за месо и вълна

- Английски късовълнести (Суфолк, Хемпшир, Дорсет, Клън форест)
- Френски породи (Ил дьо Франс, Шароле, Блю дьо мен, Тексел)

в) за мляко (Източнофризийска)

3. Полугрубовълнести породи

а) за вълна (килимен тип) и месо (Драйсдейл, Таджикска и др.)

б) за мляко, месо и вълна (Плевенска черноглава, Старозагорска, Маришка, Хиос)

4. Грубовълнести породи

а) за месо, мляко и вълна (Хисарска, Еделбаевска и др.)

б) за месо, мляко и вълна (Каракачанска, Сакарска, Странджанска и др.)

в) за мляко (Аваси)

г) за астраган (Каракулска)

д) за шубни кожи (Романовска)

5. Безвълнести породи

Австралийски меринос

Файн

Медиум

Стронг

Австралийски меринос

Австралийски безрог меринос

Борула

Кавказка порода

Асканийска порода

Североизточнобългарска тънкорунна

Североизточно-българска тънкорунна

Тракийска тънкорунна

Карнобатска тънкорунна

Дунавска тънкорунна

Меринофлайш

Южнобългарски коридел

Южнобългарски коридел

Цигай

Цигай

Линколн

provided by Sally Anne Thompson

Ромни марш

Суфолк

Живо тегло:

Кочове - 125-135 kg

Овце – 75-90 kg

Плодовитост 162 %

Среднодневен прираст:

- от 10 до 30 ден – 201

- от30 до 70 ден – 303 g



Хемпшир

Ил дьо Франс

Популация във Франция
240 000 овце
(28 375 от тях се контролират)

Живо тегло:
Кочове - 110-150 kg
Овце – 70-90 kg
Плодовитост 174 %
Среднодневен прираст:
от 10 до 30 ден – 263 g
от 30 до 70 ден – 373 g

Тексел

Популация във Франция
360 000 овце
(15 741 от тях се контролират)

Живо тегло:
Кочове - 115-130 kg
Овце – 80-90 kg
Плодовитост 195 %
Среднодневен прираст:
- от 10 до 30 ден – 275 g
- от 30 до 70 ден – 321 g

Агнешки трупчета от породата Тексел

Шароле

Популация във Франция
380 000 овце
(10 891 от тях се контролират)

Живо тегло:
Кочове - 120-150 kg
Овце – 75-95 kg
Плодовитост 187 %
Среднодневен прираст:
от 10 до 30 ден – 264 g
от 30 до 70 ден – 340 g

Шароле

Блю дьо Мен

Популация във Франция
47 000 овце
(733 от тях се контролират)

Живо тегло:
Кочове - 110-120 kg
Овце – 80-90 kg
Плодовитост 195 %
Среднодневен прираст:
от 10 до 30 ден – 272 g
от 30 до 70 ден – 317 g

Източнофризийска

Млечност: 500 – 700 l **Рекорд 1283 l за лактация**

Живо тегло: **Вълнодобив:**

- **Кочове 90 – 110 kg** **5 – 6 kg** **Плодовитост: 200 – 225 %**
- **Овце 70 – 90 kg** **4 – 4,5 kg.**

Аваси

Млечност: 300-400 l **за 210 дневна лактация**

Живо тегло:

- Кочове 80 - 90 kg
- Овце 50 – 55 kg

Вълнодобив:

1,5 – 2 kg

Вълната е груба нееднородна с наличие на голям процент мъртви влакна

Лакон

Популация във Франция:
800 000 овце
(727 453 от тях се контролират)

Млечност:
270 литра за 165 дневна лактация (получени след отбиване на агнетата на 25 дни)

Френски сирена



ПЛЕВЕНСКА ЧЕРНОГЛАВА ПОРОДА

Млечност: 180 - 220 l за 200 дневна лактация

Живо тегло:	Вълнодобив:	Плодовитост:
- Кочове 80 - 100 kg	3 – 3,5 kg	130 – 150 %
- Овце 60 – 65 kg	4 – 4,5 kg	

Старозагорска местна порода

Млечност:

160 – 180 l

Рекорд: 510 l

Живо тегло:

Кочове 80 – 90 kg

Овце 60 – 65 kg

Вълнодобив:

Кочове 4 – 4,5 kg

Овце 2,6 – 2,8 kg

Вълната е бяла полугруба

Плодовитост:

120 – 125 %

Живо тегло: - Кочове – 80-90 kg
- Овце – 50-60 kg

Плодовитост 273 %

Местна Карнобатска

Живо тегло:
Кочове – 50-60 kg
Овце – 40-45 kg

Вълнодобив:
3 - 4 kg
2.5 – 3 kg

Плодовитост:
105 %

Каракачанска

Живо тегло:	Вълнодобив:	Плодовитост:
Кочове – 50-60 kg	2 - 3 kg	105 %
Овце – 30-40 kg	1.5 – 2 kg	

Благодаря Ви за вниманието